



Polipose Intestinal Familiar: um relato de caso.

Autor(es): Saulo Emanuel Barbosa de Oliveira

Instituição: Hospital Universitário Clemente de Faria ? Montes Claros ? MG. Objetivo: Relatar um caso de Polipose Intestinal Familiar. Método: Análise de prontuário e revisão de literatura. Resultado: A polipose adenomatosa familiar é uma doença autossômica dominante, com elevada penetrância, caracterizada pela presença de mais de cem pólipos adenomatosos distribuídos por todo o cólon e reto, sendo responsável por 1% dos cânceres colorretais. A idade de aparecimento dos pólipos situa-se ao redor dos 25 anos, encontrando-se uma diversidade de apresentações morfológicas e histológicas. Virtualmente, todos os pacientes com polipose adenomatosa familiar desenvolvem carcinoma colorretal com a idade aproximada de 40 anos, se não forem devidamente tratados. O padrão ouro do tratamento cirúrgico da polipose adenomatosa familiar baseia-se na proctocolectomia total com confecção do reservatório ileal (RI) anastomosado ao canal anal. Paciente C.R.O de 24 anos, masculino faiodermo, com história de há aproximadamente um ano ter iniciado diarreia aquosa com conteúdo sanguinolento intercalada com períodos de evacuações fisiológicas. Exame físico sem particularidades. Colonoscopia evidenciando centenas de pólipos distribuído em todo o reto e cólons, até o ceco. Histopatológico evidenciou pólipos adenomatosos. Apresenta história familiar positiva para polipose adenomatosa familiar. Foi submetido a proctocolectomia total com anastomose íleo-anal com reservatório em 'J' de aproximadamente 15 cm e ileostomia protetora. Achados histopatológicos de polipose adenomatosa tubular múltipla de cólon. Reconstituição de trânsito realizada após três meses. Paciente em acompanhamento ambulatorial até a presente data. Conclusão: O tratamento cirúrgico da polipose adenomatosa familiar com proctocolectomia total com confecção do reservatório ileal (RI) anastomosado ao canal anal apresenta bons resultados de morbimortalidade, sendo o mesmo considerado padrão-ouro para tratamento de polipose adenomatosa familiar.