



## LESÕES DE COLO UTERINO COMPARADOS COM A IDADE DE ÍNICIO DE ATIVIDADE SEXUAL DE MULHERES ATENDIDAS NA POLICLÍNICA DR. ALPHEU GONÇALVES DE QUADROS

Autor(es): Fernanda Paluszkievicz Dullius, Marieny Dutra Souto, Hubert Caldeira, Ronaldo Eustáquio de Oliveira Júnior, Ronilson Ferreira Freitas

**Objetivo:** Comparar a ocorrência de lesões de colo de útero de mulheres com a idade de início de atividade sexual. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa descritiva, quantitativa e documental. Analisou-se 570 prontuários de mulheres atendidas no ambulatório de patologia do trato genital inferior da Policlínica Dr. Alpheu Gonçalves de Quadros no período de 1996 a 2012, onde foram analisadas variáveis que demonstram fatores de risco para lesões de colo uterino nas referidas pacientes. Os dados foram analisados com o programa SPSS, onde foi possível comparar as lesões de colo uterino com a idade de início de atividade sexual. **Resultados:** Dentre os prontuários analisados, 20,5% das mulheres relatam ter iniciado a atividade sexual antes dos 15 anos, 64% entre 16 e 20 anos, 14,6% de 21 a 30 anos e 0,9% com mais de 30 anos. Houve maior ocorrência de lesões de colo uterino em mulheres que iniciaram a atividade sexual com faixa etária entre 16 e 20 anos, sendo que houve 103 casos de NIC I e 262 casos de NIC II e III. Os menores índices foram para as mulheres que se tornaram sexualmente ativas com mais de 30 anos, onde ocorreram apenas 3 casos de NIC I e 2 casos de NIC II e III. **Conclusão:** Conclui-se que, a maior parte de mulheres atendidas no ambulatório acima citado se tornaram sexualmente ativas com idade entre 16 e 20 anos, com maior frequência de lesões de maior gravidade na população citada.

Número de parecer do comitê de ética: 173.364/2012