



## LESÕES DE COLO UTERINO DE MULHERES ATENDIDAS NA POLICLÍNICA DR. ALPHEU GONÇALVES DE QUADROS DE ACORDO COM NÚMERO DE PARCEIROS SEXUAIS

Autor(es): Fernanda Paluszkievicz Dullius, Marieny Dutra Souto, Hubert Caldeira, Ronaldo Eustáquio de Oliveira Júnior, Ronilson Ferreira Freitas

**Objetivo:** Comparar a ocorrência de lesões de colo uterino de mulheres com o número de parceiros sexuais.

**Metodologia:** Trata-se de pesquisa descritiva, quantitativa e documental. Analisou-se 570 prontuários de mulheres atendidas no ambulatório de patologia do trato genital inferior da Policlínica Dr. Alpheu Gonçalves de Quadros no período de 1996 a 2012, onde foram analisadas variáveis que demonstram fatores de risco para lesões de colo uterino nas referidas pacientes. Os dados foram analisados com o programa SPSS, onde foi possível comparar as lesões de colo uterino com o número de parceiros sexuais das mulheres.

**Resultados:** Dentre os prontuários analisados, 26,1% responderam ter relação sexual apenas com 1 parceiro e 73,9% com mais de 1. Dentre as pacientes que possuíam 1 parceiro sexual, 80 apresentaram neoplasia intra-epitelial cervical de grau I (NIC I), 69 apresentaram NIC II e III. Houve maior prevalência de lesões em pacientes que se relacionavam sexualmente com mais de 1 parceiro, sendo que teve 82 casos de NIC I, 335 de NIC II e III e 4 casos apresentaram cervicite. **Conclusão:** Conclui-se que, houve maior ocorrência para neoplasia intra-epitelial cervical de grau II e III, sendo que mulheres que mantêm relação sexual com mais de um parceiro teve os maiores índices para as lesões de grau I, II e III.

Número de parecer do comitê de ética: 173.364/2012